

FERTILIZANTE BIOLÓGICO

# RILOTUS LIQ

Líquido de aplicación directa

Medio estéril con bacterias fijadoras de nitrógeno (*Mesorhizobium loti*).

Para inocular 25 kg de semillas de lotus (*Lotus tenuis*, *Lotus corniculatus*).

Contenido neto: 200 mL

**SENASA N° 21.471**

AGITAR ANTES DE USAR.

INDUSTRIA ARGENTINA

Es un producto de:

 **Rizobacter**

**Rizobacter Argentina S.A.**

LABORATORIO ELABORADOR de PRODUCTOS BIOLÓGICOS N° PB0013

Avda. Dr. Arturo Frondizi N° 1.150- Parque Industrial

C.P. B2702AME - Pergamino - Bs. As. - Argentina

Tel.: +54 2477 409400 Fax: +54 2477 432893

[www.rizobacter.com](http://www.rizobacter.com)

**PRECAUCIONES:**

- Respetar la fecha de vencimiento.
- Emplear solamente para las semillas indicadas en este envase.
- No exponer el inoculante al sol y conservarlo a la sombra < 25°C.
- Una vez abierto el envase, pierde su condición de esterilidad.

**ALMACENAMIENTO:**

Almacenar en lugares frescos (temperatura menor a 25°C) y a la sombra, al resguardo de productos que puedan emanar vapores tóxicos.

**GENERALIDADES:**

Inoculante formulado con bacteria fijadora de nitrógeno *Mesorhizobium loti*. RILOTUS LIQ contiene a la elaboración más de  $1 \times 10^9$  UFC/mL y más de  $1 \times 10^8$  UFC/mL al vencimiento, cuando el producto se almacena en las condiciones recomendadas.

**INSTRUCCIONES DE USO**

**Dosis:** 200 mL cada 25 kg de semillas de lotus.

**Método de aplicación:**

1. Agitar vigorosamente, al menos durante 30 segundos, justo antes de utilizar.
2. Aplicar a las semillas a la dosis indicada utilizando máquinas diseñadas para este proceso, controlando que la cobertura del producto resulte completamente uniforme.
3. Dejar secar la semilla tratada unos minutos y proceder a la siembra. Deben sembrarse las semillas dentro de las 24 horas posteriores a su tratamiento.

- **Rizobacter Argentina S.A. recomienda el uso del protector de bacterias Premax para obtener una adecuada respuesta a la inoculación en lotes donde se prevea que las bacterias puedan estar sometidas a algún tipo de estrés.**
- **Todo el proceso de inoculación debe realizarse en ambientes frescos menores a 25°C y a la sombra.**
- **Realizar la calibración de la sembradora con la semilla tratada.**

**Nota:** Una vez realizado el despacho del inoculante desde la planta de elaboración, el producto escapa del control del fabricante. RIZOBACTER ARGENTINA S.A. no se responsabiliza por el uso del mismo ni asume responsabilidad alguna por la pérdida parcial o total de la cosecha.