Fertilizante Biológico

Rizofos Liq Girasol

Líquido de aplicación directa

Bacterias solubilizadoras de fósforo y estimuladoras del crecimiento vegetal (*Pseudomonas fluorescens*)

SENASA N°: 20.548

Lote:
Vencimiento:

AGÍTESE ANTES DE USAR

INDUSTRIA ARGENTINA

Es un producto de:

Rizobacter

RIZOBACTER ARGENTINA S.A.
Laboratorio Elaborador de Productos Biológicos PB N°0013
Avda. Dr. Arturo Frondizi N° 1150 – Parque Industrial –
C.P. B2702HDA – Pergamino – Buenos Aires – Argentina
Tel: +54 2477 409400 – www.rizobacter.com

PRECAUCIONES:

- Respetar la fecha de vencimiento.
- Emplear solamente para las semillas de los cultivos indicados en este envase.
- No exponer el inoculante al sol y conservar a la sombra y en lugares frescos.
- Una vez abierto el envase, el fertilizante biológico pierde su condición de esterilidad, por lo tanto no almacenarlo en ese estado.

ALMACENAMIENTO:

Este producto debe ser almacenado a la sombra y en lugares frescos (temperatura menor a 25°C).

GENERALIDADES:

Este fertilizante biológico está elaborado con cepas especialmente seleccionadas por su alta eficiencia en la solubilización del fósforo del suelo y su acción sobre la estimulación del crecimiento vegetal.
Este producto contiene a la elaboración 1 x 10^9 bacterias por mL y a su vencimiento 1 x 10^8 bacterias por mL.

INSTRUCCIONES DE USO:

Procedimiento para inocular 100 kg de semillas de girasol con **Rizofos Liq Girasol + Premax R**:
1. Colocar el contenido de un sachet de **Premax R** (200 mL) en un contenedor limpio.
2. Agregar el contenido de una vejiga de **Rizofos Liq Girasol** (2 L) y revolver hasta obtener una mezcla homogénea.
4. Tratar 100 kg de semilla con el volumen de mezcla final (2,2L). Mezclar hasta obtener una cobertura uniforme de la semilla.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS DE **PREMAX R** (mL/100 kg de semilla)	DOSIS DE **RIZOFOS LIQ GIRASOL** (mL/100 kg de semilla)
GIRASOL	200	2000

RECOMENDACIONES IMPORTANTES:

- Es aconsejable realizar la inoculación en máquinas especiales para el tratamiento de semillas, lo cual permite obtener una distribución y cobertura uniformes del producto sobre las semillas.
- Todo el proceso de inoculación debe hacerse en lugares donde no incida directamente la radiación solar.
- En el caso de que la siembra se realice seguidamente del tratamiento de semilla y bajo condiciones de alta humedad ambiental, se recomienda orear la semilla tratada (al menos 30 minutos) hasta que ésta se encuentre completamente seca, antes de colocarla en la sembradora.
- Realizar la calibración de la sembradora con la semilla tratada.

NOTA: Como a partir del despacho del inoculante desde la planta de elaboración, el producto escapa del control del fabricante, Rizobacter Argentina S.A. no se responsabiliza por el uso del mismo ni asume responsabilidad alguna por la pérdida parcial o total de la cosecha.