

Fertilizante Biológico

Rizofos Liq Maíz

Pre-inoculado

Líquido de aplicación directa

AGÍTESE ANTES DE USAR

Bacterias solubilizadoras de fósforo y estimuladoras del crecimiento vegetal (*Pseudomonas fluorescens*)

SENASA N°: 21.351

Lote:

Vencimiento:

INDUSTRIA ARGENTINA

Es un producto de:



RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

Laboratorio Elaborador de Productos Biológicos PB N°0013

Avda. Dr. Arturo Frondizi N° 1150 – Parque Industrial –

C.P. B2702HDA – Pergamino – Buenos Aires – Argentina

Tel: +54 2477 409400 – www.rizobacter.com

PRECAUCIONES:

- Respetar la fecha de vencimiento.
- Emplear solamente para las semillas de los cultivos indicados en este envase.
- No exponer el inoculante al sol y conservar a la sombra y en lugares frescos.
- Una vez abierto el envase, el fertilizante biológico pierde su condición de esterilidad, por lo tanto no almacenarlo en ese estado.

GENERALIDADES:

Este fertilizante biológico está elaborado con cepas especialmente seleccionadas por su alta eficiencia en la solubilización del fósforo del suelo y su acción sobre la estimulación del crecimiento vegetal.

Este producto contiene a la elaboración 1×10^9 bacterias por mL y a su vencimiento 1×10^8 bacterias por mL.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugares frescos (temperatura menor a 25°C) y a la sombra, al resguardo de productos que puedan emanar vapores tóxicos.

INSTRUCCIONES DE USO:

Dosis: 800 mL Rizofos Liq Maíz Preinoculado + 200 mL Premax R cada 100 kg de semillas de maíz.

Método de Aplicación:

1. Agitar vigorosamente cada producto, al menos durante 30 segundos, justo antes de utilizar.
2. Colocar en un recipiente contenedor el volumen de Premax R recomendado
3. Agregar el volumen de fertilizante biológico recomendado y revolver hasta obtener una mezcla homogénea.
4. Aplicar a las semillas a la dosis indicada utilizando máquinas diseñadas para este proceso, controlando que la cobertura del producto resulte completamente uniforme.
5. Almacenar las semillas tratadas en ambientes frescos (temperatura menor a 25°C) y aireados, hasta 60 días* antes de la siembra. Evitar la cercanía a productos que pudieran emanar vapores tóxicos.

***El tiempo de preinoculación está condicionado por la aplicación de productos químicos sobre la semilla. Consultar con el Soporte Técnico de Rizobacter para obtener las recomendaciones de manejo.**

- Todo el proceso de inoculación debe hacerse en ambientes frescos menores a 25°C y a la sombra.
- En caso de usar insecticidas o fungicidas, los mismos deberán aplicarse primero y posteriormente este inoculante.
- En el caso de que la siembra se realice seguidamente del tratamiento de semilla y bajo condiciones de alta humedad ambiental, se recomienda arear la semilla tratada (al menos 30 minutos) hasta que ésta se encuentre completamente seca, antes de colocarla en la sembradora.
- Realizar la calibración de la sembradora con la semilla tratada.

NOTA: Como a partir del despacho del inoculante desde la planta de elaboración, el producto escapa del control del fabricante, Rizobacter Argentina S.A. no se responsabiliza por el uso del mismo ni asume responsabilidad alguna por la pérdida parcial o total de la cosecha.