

FERTILIZANTE BIOLÓGICO

RIZOLIQLLI Maní

Líquido de aplicación directa

Medio estéril con bacterias fijadoras de nitrógeno *Bradyrhizobium* sp.

El contenido de este envase alcanza para inocular 2000kg de semillas de maní (*Arachis hypogaea*).

SENASA N° 21.589

Lea íntegramente esta etiqueta antes de utilizar el producto.

Agítese antes de usar.

Cont. Neto: 8 L

INDUSTRIA ARGENTINA

Fabricante:

 **Rizobacter**

Rizobacter Argentina S.A.

LABORATORIO ELABORADOR de PRODUCTOS BIOLÓGICOS N° PB0013

Avda. Dr. Arturo Frondizi N° 1.150- Parque Industrial

C.P. B2702AME - Pergamino - Bs. As. - Argentina

Tel.: +54 2477 409400 Fax: +54 2477 432893

www.rizobacter.com

PRECAUCIONES:

- . Respetar la fecha de vencimiento.
- . Emplear solamente para las semillas indicadas en este envase.
- . No exponer el inoculante al sol y conservar a la sombra en lugares frescos.
- . Una vez abierto el envase, el inoculante pierde su condición de esterilidad.

ALMACENAMIENTO:

Para mantener su viabilidad, este producto debe ser almacenado en lugares frescos y a la sombra (temperatura inferior a 25°C).

GENERALIDADES:

Rizoliq LLI Maní está elaborado con cepas especialmente seleccionadas por su alta capacidad de fijación de nitrógeno. Contiene 1×10^{10} bacterias por mL a la elaboración y 1×10^9 bacterias por mL a su vencimiento, cuando el producto se almacena en las condiciones recomendadas.

Rizoliq LLI Maní es elaborado con componentes de alta calidad e incluye en su formulación la Tecnología Osmo-Protectora (TOP) que maximiza la protección celular, alcanzando altos niveles de supervivencia bacteriana sobre la semilla, aumentando los tiempos de pre-inoculación.

INSTRUCCIONES DE USO:

Dosis: 200 mL Rizoliq LLI Maní + 70 mL Premax LLI II cada 50 kg de semilla.

Método de aplicación:

Procedimiento para inocular 2000 kg de semillas **hasta 30 días antes de la siembra:**

1. Agitar vigorosamente los productos, al menos durante 30 segundos, justo antes de utilizarlos.
2. Mezclar una unidad (8 L) de Rizoliq LLI Maní con una unidad (2.8 L) de Premax LLI II y dejar reposar la mezcla entre 15 y 60 minutos antes de la aplicación sobre las semillas. Utilizar una dosis de la mezcla Rizoliq LLI Maní y Premax LLI II equivalente de 270 mL cada 50 kg.
3. Aplicar a las semillas utilizando maquinas diseñadas para este proceso, controlando que la cobertura del producto resulte completamente uniforme.
4. Almacenar las semillas tratadas en ambientes frescos (temperatura menor a 25°C) y aireados, hasta 30 días antes de la siembra. Evitar la cercanía a productos que pudieran emanar vapores tóxicos.

Todo el proceso de inoculación debe hacerse en ambientes frescos menores a 25°C y a la sombra.

En caso de usar insecticidas o fungicidas, los mismos deberán aplicarse primero y posteriormente este inoculante.

NOTA:

Como a partir del despacho del inoculante desde la planta de elaboración, el producto escapa del control del fabricante, RIZOBACTER ARGENTINA S.A. no se responsabiliza por el uso del mismo ni asume responsabilidad alguna por pérdida parcial o total de la cosecha