

FERTILIZANTE BIOLÓGICO

RIZOLIQ SURCO

LÍQUIDO DE APLICACIÓN EN EL SURCO

Medio estéril con bacterias fijadoras de nitrógeno *Bradyrhizobium sp.*

Inscrito ante el SENASA bajo el N° 20.872

El contenido de este envase alcanza para inocular 5 hectáreas de soja (*Glycine max*)

Contenido neto: 2L

Formulación líquida acuosa estéril.

Agítese antes de usar.

Industria Argentina.

Es un producto de:

 **Rizobacter**

Rizobacter Argentina S.A.

Microbiología Agrícola

LABORATORIO ELABORADOR de PRODUCTOS BIOLÓGICOS N° PB0013

Avda. Dr. Arturo Frondizi N° 1.150- Parque Industrial

C.P. B2702HDA - Pergamino - Bs. As. - Argentina

Tel.: +54 2477 409400 Fax: +54 2477 432893

www.rizobacter.com

Precauciones:

- RESPETE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- EMPLEE SOLAMENTE PARA SEMILAS INDICADAS EN ESTE ENVASE.
- NO EXPONGA EL INOCULANTE AL SOL Y CONSÉRVELO A LA SOMBRA EN LUGARES FRESCOS.
- UNA VEZ ABIERTO AL ENVASE PIERDE SU CONDICIÓN DE ESTERILIDAD.

Almacenamiento:

Este producto debe ser almacenado en lugares frescos y a la sombra (temperatura inferior a 25°C). Si se conserva en heladera, debe colocarse lejos del congelador.

Generalidades:

Este inoculante está elaborado con cepas seleccionadas especialmente de bacterias fijadoras de nitrógeno. Este producto contiene a la elaboración 1 x 10⁹ bacterias por mL, y a su vencimiento 1 x 10⁸ bacterias por mL, cuando el producto se almacena en las condiciones recomendadas.

Instrucciones de Uso:

Dosis: 2L cada 5 hectáreas de soja.

Definir el caudal de agua a utilizar antes de la aplicación a campo, siendo el sugerido de 20 L de agua por hectárea. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:

- 1- Regular el equipo inoculador en la línea previamente a su uso en el campo, de acuerdo con las indicaciones especificadas.
- 2- Llenar el tanque del equipo inoculador con agua no clorada y sin desinfectante hasta el 50% de su volumen total.
- 3- En un recipiente limpio, mezclar **RIZOLIQ SURCO** y **PREMAX** a razón de 4 L y 0,7 L respectivamente. Revolver hasta lograr una mezcla homogénea.
- 4- Agregar la mezcla de **RIZOLIQ SURCO** y **PREMAX** al tanque del equipo inoculador.
- 5- Completar el tanque del equipo inoculador hasta su volumen máximo.
- 6- Homogeneizar adecuadamente el caldo a inocular antes de la aplicación.

Importante:

El medio de este producto ha sido esterilizado previamente a la incorporación de los rizobios, suministrando exclusivamente a las semillas las bacterias fijadoras de nitrógeno sin otros organismos contaminantes. **RIZOLIQ SURCO** es un inoculante con alta concentración bacteriana, formulado especialmente para la inoculación en el surco de siembra, por lo que no debe aplicarse en forma directa sobre la semilla de soja.

Nota: Como a partir del despacho del inoculante desde la planta de elaboración, el producto escapa del control del fabricante, RIZOBACTER ARGENTINA S.A. no se responsabiliza por el uso del mismo ni asume responsabilidad alguna por pérdida parcial o total de la cosecha.