

FERTILIZANTE BIOLÓGICO

# RIZOLIQ SURCO MANÍ

Líquido de aplicación en el surco

El contenido de este envase alcanza para inocular 5 hectáreas de maní (*Arachis hypogaea*).

Medio estéril con bacterias fijadoras de nitrógeno (*Bradyrhizobium* sp.)

Contenido neto: **7,5 L**

**SENASA N°: 20.930**

Fecha de Vencimiento: (ver en el envase)

Número de lote: (ver en el envase)

Agitar antes de usar.

INDUSTRIA ARGENTINA.

Fabricado por:



**Rizobacter Argentina S.A.**

LABORATORIO ELABORADOR de PRODUCTOS BIOLÓGICOS N° PB0013

Avda. Dr. Arturo Frondizi N° 1.150- Parque Industrial

C.P. B2702AME - Pergamino - Bs. As. - Argentina

Tel.: +54 2477 409400 Fax: +54 2477 432893

**[www.rizobacter.com](http://www.rizobacter.com)**

**PRECAUCIONES:**

- Respetar la fecha de vencimiento.
- Emplear solamente para semillas indicadas en este envase.
- No exponer el inoculante al sol y conservar a la sombra en lugares frescos.
- Una vez abierto el envase pierde su condición de esterilidad.

**ALMACENAMIENTO:**

Este producto debe ser almacenado en lugares frescos y a la sombra (temperatura inferior a 25°C). Si se conserva en heladera, debe colocarse lejos del congelador.

**GENERALIDADES:**

Este inoculante está elaborado con cepas seleccionadas especialmente de bacterias fijadoras de nitrógeno. Este producto contiene a la elaboración  $1 \times 10^9$  bacterias por mL, y a su vencimiento  $1 \times 10^8$  bacterias por mL, cuando el producto se almacena en las condiciones recomendadas.

**INSTRUCCIONES DE USO**

**Dosis:** 7,5 L cada 5 hectáreas de maní.

Definir el caudal de agua a utilizar antes de la aplicación a campo, siendo el sugerido de 20 a 40 a litros de agua por hectárea. Lavar el equipo previo a su uso para evitar la mortandad de bacterias producida por eventuales residuos de productos anteriormente utilizados. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:

1. Regular el equipo inoculador en la línea previamente a su uso en el campo, de acuerdo con las indicaciones especificadas. Llenar el tanque del equipo inoculador con agua no clorada y sin desinfectante hasta el 50% de su volumen total.
2. Agregar el contenido de una vejiga de **RIZOLIQ SURCO MANÍ** (7,5 L) al tanque del equipo inoculador.

Dosis recomendada: 1,5 L por hectárea entre surcos a 70 cm ó 10,5 mL cada 100 m de surco individual. Completar el tanque del equipo inoculador hasta su volumen máximo.

3. Homogeneizar adecuadamente todo el caldo a inocular antes de la aplicación.

**IMPORTANTE:**

El medio de este producto ha sido esterilizado previamente a la incorporación de los rizobios, suministrando exclusivamente a las semillas las bacterias fijadoras de nitrógeno sin otros organismos contaminantes.

**RIZOLIQ SURCO MANÍ** es un inoculante con alta concentración bacteriana, formulado especialmente para la inoculación en el surco de siembra, por lo que no debe aplicarse en forma directa sobre la semilla de maní.

**Nota:** Como a partir del despacho del inoculante desde la planta de elaboración, el producto escapa del control del fabricante, RIZOBACTER ARGENTINA S.A. no se responsabiliza por el uso del mismo ni asume responsabilidad alguna por pérdida parcial o total de la cosecha.